Rapport

sur l'observation d'une hydrocele, avec suppuration du testicule, envoyée à l'academie R. de Chirurgie par M. La Flize fils Prof. R. du Coll. de Chir. de Nancy.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE N. C
26 3273
ACADÉMIE ... MÉDECINE

Coté cinq feuillets le bibliothre A Ducroy

un jeune homme de dix sept ans de foible complexion avoit eu à l'age de cinq, une hernie inguinale du côté droit. il en avoit été guéri par l'application d'un Bandage porté pendant deux ans. on remarqua seulement que de ce côté, le testicule étoit plus gros que l'autre. ce nouvel accident donna lieu à diverses opinions, les uns soutenoient que la hernie étoit devenue complete, Mess. La Flize pere et fils furent d'avis que c'étoit une hydrocele dont il falloit observer la marche. neuf années se sont écoulées sans qu'on remarqua rien de particuli

pendant les vacances de quatrevingt
Sept après avoir chassé immodérément
Le Malade se sentit très fatigué, La
tumeur devint très douloureuse, ~~après~~
vingt quatre heures de repos, des Cata-
plâmes de mie de Pain et de
Lait Suffirent pour dissiper cet accident.

au mois de décembre dernier en
descendant un Escalier de Nuit, le
Malade sentit une douleur vive au
testicule, Laquelle fut Suivie de
foiblesse. On ~~coucha le ott~~ le coucha
On eut recours au même Cataplâme
qui L'année précédente avoit bien réussi
il n'en fut pas de même cette fois,
La douleur augmenta, La fievre s'alluma,
le malade vomit Les alimens, et ensuite
des matieres bilieuses, La durée de ces
accidens détermina le pere du malade
à mander Mr La Flize lequel s'y
rendit le même soir, ~~troisième~~ 2eme jour révolu

depuis l'accident, il reconnut à la sensibilité du Scrotum et à sa rougeur, que les membranes propres du testicule avoient été distendues et irritées par l'effort qu'avoit fait le jeune homme. il appliqua des Cataplasmes émolliens et résolutifs. la fièvre le teint jeaunâtre, la saburre de la langue l'empêcherent de pratiquer les saignées il crut que la diette rigoureuse, ~~les~~ boissons accidulées pourroient les remplacer, il crut cependant devoir en conferer avec Mr son Pere lequel fut du même avis. le lendemain la douleur et le vomissement augmenterent on varia les Cataplasmes, les boissons, mais la fréquence du vomissement, ~~l'opiniatreté du pal~~ l'Etat souffrant du malade déterminerent Mess la flize à pratiquer l'Opération

Le Malade en situation convenable Mr la flize, le fils, fit une incision laquelle s'étendoit vers le haut jusqu'à

l'anneau, et au plus bas du Scrotum.
cette incision fut faite avec beaucoup
de soin dans la crainte qu'il n'y eut
complication de maladies. il divisa les
membranes les unes après les autres.
parvenu dans l'intérieur du sac
de l'hydrocele, il s'en ecoula deux gobelets
d'Eau, et une Cuillerée de Pus. il dissé-
qua, et retrancha une partie de la
tunique vaginale, ~~laquelle~~ qu'il trouva
fort épaisse ainsi que l'albuginée.
le testicule étoit en suppuration, il
en emporta des Lambeaux de façon
qu'il ne restoit plus que l'Epididime
Lequel étoit sain. le malade perdit
peu de sang. Le pancement fut fait
à l'ordinaire on mit sur le ventre
des fomentations émollientes. La diette
fut recommandée de nouveau on
prescrivit des boissons légères, telles que
L'Eau de poulet, les tisannes de Chiendent
La limonade legere. le Malade se sentit

très soulagé après l'opération, il dormit
très bien, le vomissement s'arrêta, la fièvre
diminua, le lendemain on avoit les plus
grandes espérances, malheureusement cet
état avantageux ne se soutint pas. le
ventre se météorisa, les nausées, les
coliques la fièvre se déclarèrent, le
malade vomit une jatte d'humeur
bilieuse et quatre gros vers vivans.
on crut qu'une fièvre vermineuse
compliquoit la maladie Chirurgicale
on prescrivit les entelmintiques en potions
et en lavemens, le vomissement ne
reparut qu'après des intervales plus
éloignés et il étoit presque toujours accom-
pagné de vers.

Le premier pansement fut fait vers
la fin du second jour après l'opération
il y avoit un dégorgement considérable
et la plaie étoit aussi belle qu'elle pouvoit
l'être, au second pansement on vit des
escharres sur le reste du testicule, et on mit

sur quelques portions des membranes propres une legere dissolution de Pierre à Cautere. les chairs des environs commencoient à rougir, mais les coliques la fievre, les nausées, le vomissement la constipation inquietoient les parens et les gens de l'art. Mr Laflize crut ne pas devoir s'ecarter des indications et tous les jours le malade rendoit des vers, cependant l'opiniatreté des accidens lui fit soupçonner qu'il se passoit quelques scenes facheuses dans le bas ventre. en effet une tumeur inflammatoire et oblongue survenue dans l'aine du même coté justifioit ~~déja~~ en partie son prognostic. on la pansa avec les cataplasmes émollients et resolutifs. bientot on soupçona un épanchement dans le bas ventre. cependant la plaie ne se ressentoit en rien de ce désordre, car les escharres tombèrent le huitieme jour, et le volume ~~de la tumeur~~ du scrotum n'étoit pas

plus gros que dans l'Etat ordinaire
bientôt l'intermittence du pouls, la maigreur du visage, les foiblesses se succéderent, et le 14eme jour le malade succomba.

A l'ouverture du Cadavre, on trouva dans le bas ventre et le petit Bassin un Epanchement considérable de Pus, d'excrement, et de matiere noiratre, les intestins grêles et gros avoient plus de capacité que dans l'Etat ordinaire. La fin du duodenum le Commencement du jejunum, la portion de l'ileon et du Colon qui se trouvent à la fin de la colonne epiniere étoient collés et confondus ensemble. Leurs tuniques étoient externes étoient en suppuration, ainsi que le mesentere adjacent. il y avoit une large ouverture au Colon près du Coecum par laquelle toutes les matieres stercorales s'étoient echappées dans le ventre.

en reflechissant sur tout ce qui s'est passé avant et depuis l'operation, ajoute Mr La Flize, je serois porté à croire

que l'Effort que le malade a fait en portant la charge dont il a été question s'est communiqué par le cordon au tissu cellulaire, et aux membranes des vaisseaux spermatiques, qu'elle a gagné les intestins juxta-apposés que la suppuration a produit une cohésion, et une confusion de ces parties entr'elles, l'ulcère des tuniques du colon, la gangrène et la mort.

M. La Flize termine son mémoire par deux questions qu'il adresse à l'académie. Etoit-il possible de sauver le malade en pratiquant l'opération vingt quatre heures plutot?

Falloit-il le saigner plusieurs fois malgré les contr'indications dont nous avons déja parlé?

à juger d'événement, nous croyons que M. La Flize aura pu regréter après l'opération de ne l'avoir pas pratiqué la veille, puisque la presence

du bus dans les ~~nombreuses~~ progrès
du testicule avoit occasionné la des-
truction de cet organe, ce qu'on auroit
évité peut-être si l'évacuant vingt
quatre heures plutôt.

pour répondre à la seconde
question, les saignées étoient indispensables
pour détruire une inflammation aussi
forte que celle qui a du exister d'après
l'examen des parties dont on vient d'en-
tendre le rapport. mais nous le répetons
ce n'est que d'après l'évenement que
nous proposons aussi affirmativement,
et il seroit possible que les censeurs de
la conduite de Mr La Flize se placants
aux mêmes époques où il a paru douter
de la nécessité de ~~saignée~~ l'opération,
et de celle des saignées eussent respecté
les mêmes considérations qui lui ont
fait différer l'une, et s'abstenir des
autres.

au reste cette maladie et son traitement
sont décrits avec beaucoup de méthode

Les secours variés et sagement combinés que Mr La Blège a employé dans une maladie aussi compliquée, sont l'éloge de ses connoissances et de ses talens, et quoique l'hydrocele compliquée d'abcès du testicule ne soit point sans exemple l'auteur n'en mérite pas moins les remerciemens de l'academie.

Rodin